

Séminaires de pharmacothérapie - FARM22

Anticoagulation et antiplaquettaires: études de cas

Cas n°1

B.S., monsieur de 83 ans

- en visite chez sa fille (après un vol de 5h)

était en forme jusqu'à ce qu'il ressent des douleurs dans la jambe droite et d'un oedème se développe; le lendemain les symptômes n'avaient pas disparu et sa fille l'emmène à l'hôpital, où une thrombose veineuse profonde est diagnostiquée. Après avoir reçu une dose de charge par perfusion monsieur BS reçoit du Clexane® (2 injections à 80mg / jour).

- Mr S a déjà eu une thrombose veineuse 6 ans auparavant
- Autres éléments d'information:
 - cancer du colon 7 ans plus tôt
 - consommation importante d'alcool les jours précédents
 - surchage pondérale (BMI 29)

Les éléments suivants doivent également figurer dans votre démarche Qu(o)iDAM + plan de soins:

- Facteurs de risque pour une thrombose veineuse chez ce patient
- Objectifs du traitement (à court, moyen et long terme)
- Paramètres cliniques et de laboratoire nécessaires pour mesurer l'efficacité du traitement

Cas n°2

Mr KW, patient de 59 ans, sous traitement anticoagulant à long terme à la suite de plusieurs thromboses veineuses profondes et d'une embolie pulmonaire
Se présente à la pharmacie pour renouveler ses prescriptions, et se plaint d'avoir eu un saignement de nez il y a quelques jours, ayant duré 5 minutes (inhabituel d'après lui).
Il vient avec un renouvellement d'ordonnance (le zantac est pour le reflux oesophagien) :

Vous devez poser des questions supplémentaires à Mr KW pour élucider le(s) problème(s).

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
Cachet du pharmacien au verso Exécute le :	
REEMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du patient: Monsieur K.W. Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate)	
Réservé à la vignette du conditionnement	R/ R/ Sintrom grand modèle R/ Zantac 150
Cachet du prescripteur	Date et signature du prescripteur
Dr S.H.	

Cas n°3

Mme S.D., enceinte de 5 mois, doit rester allongée suite à des problèmes précoces de contraction. Elle est victime d'une thrombose veineuse profonde, est hospitalisée et un traitement anticoagulant doit être commencé.

Envisagez séparément les possibilités de traitement et suivi pendant le reste de la grossesse et après l'accouchement (en tenant compte du fait que Mme SD voudrait allaiter)